8. –
10. 11.
2023

SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ SLS
ČESKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
SEKCIA PRE CEREBROVASKULÁRNE OCHORENIA SNeS
CEREBROVASKULÁRNÍ SEKCE ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Vás srdečne pozývajú na:

51. SLOVENSKÝ A ČESKÝ

CEREBROVASKULÁRNY KONGRES

GRAND HOTEL BELLEVUE, HORNÝ SMOKOVEC

Ďalší deň byť Tomášom

Dysport® prináša úľavu od príznakov spasticity medzi jednotlivými aplikáciami a šancu cítiť sa opäť viac sám sebou[1]

✓ Dysport® - doba trvania účinku 12 až 16 týždňov alebo viac[1]

Dysport 500 U je indikovaný na:

- symptomatickú liečbu fokálnej spasticity horných končatín u dospelých,
- symptomatickú liečbu fokálnej spasticity členkového kĺbu u dospelých po mozgovej príhode alebo traumatickom poškodení mozgu
- dynamickú deformitu nohy v zmysle pes equinus na podklade spasticity u pediatrických pacientov s detskou mozgovou obrnou (DMO) od 2 rokov,
- symptomatickú liečbu fokálnej spasticity horných končatín u pediatrických pacientov s detskou mozgovou obrnou od 2 rokov,
- spastickú torticollis dospelých,
- blefarospazmus dospelých,
- hemifaciálny spazmus dospelých,
- hyperfunkčné línie na tvári a hyperhidróza.

Skrátená informácia o lieku

NÁZOV LIEKU: Dysport 300 U, Dysport 500 U, prášok na injekčný roztok. **ZLOŽENIE:** 1 injekčná liekovka obsahuje botulotoxín typu A – hemaglutinínový komplex 300 alebo 500 jednotiek (U) suchej substancie, roztok ľudského albumínu 20 % a laktózu. **LIEKOVÁ FORMA:** prášok na injekčný roztok. Indikácie: symptomatická liečba fokálnej spasticity horných končatín u dospelých, fokálnej spasticity členkového kĺbu u dospelých po mozgovej príhode alebo traumatickom poškodení mozgu, dynamická deformita nohy v zmysle pes equinus na podklade spasticity u pediatrických pacientov s detskou mozgovou obrnou (DMO) od 2 rokov, symptomatická liečba fokálnej spasticity horných končatín u pediatrických pacientov s DMO od 2 rokov, spastická torticollis u dospelých, blefarospazmus a hemifaciálny spazmus u dospelých, axiálna hyperhidróza a hyperfunkčné línie na tvári. **DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA:** jednotky sú špecifické pre liek Dysport a nie sú zameniteľné s iným liekom obsahujúcim botulotoxín typu A. Liek majú podávať len školení lekári. Horné a dolné končatiny: Dávkovanie má byť prispôsobené individuálne na základe veľkosti, počtu a lokalizácii postihnutých svalov, stupňa spasticity, prítomnosti lokálnej svalovej slabosti, reakcie pacienta na predchádzajúcu liečbu a/ lebo na základe nežiaduceho účinku s botulotoxínom typu A v anamnéze. *Symptomatická liečba fokálnej spasticity horných a dolných končatín u dospelých.* Zvyčajne sa nepodáva viac ako 1 ml do jedného miesta vpichu. V jednom ošetrení sa môžu podávať intramuskulárne dávky do 1 500 U. Celková dávka 1 500 U sa nemá prekročiť. *Dynamická deformita nohy (pes equinus) na podklade spasticity u pediatrických pacientov s DMO:* Maximálna podaná dávka nesmie prekročiť 15 U/kg pri jednostrannej injekcii do dolnej končatiny alebo 30 U/kg pre bilaterálne injekcie. Okrem toho, celková podaná dávka pri jednom liečebnom ošetrení nesmie presiahnuť 1 000 jednotiek alebo 30 U/kg, podľa toho, čo je nižšie. Celková podaná dávka by mala byť rozdelená medzi postihnuté spastické svaly dolnej končatiny. Nemá sa podať viac ako 0,5 ml do 1 injekčného miesta. *Fokálna spasticita horných končatín u pediatrických pacientov s DMO:* Maximálna podaná dávka pri jednostrannej injekcii pri jednom liečebnom ošetrení nesmie prekročiť 16 U/kg alebo 640 jednotiek, podľa toho, čo je nižšie. Pri bilaterálnej injekcii pri jednom liečebnom ošetrení, maximálna podaná dávka nesmie prekročiť 21 U/kg alebo 840 jednotiek, podľa toho, čo je nižšie. Celková podaná dávka sa má rozdeliť medzi postihnuté spastické svaly hornej končatiny. Nemá sa podať viac ako 0,5 ml do 1 injekčného miesta. *Dynamická deformita nohy na podklade spasticity a fokálna spasticita horných končatín u pediatrických pacientov s DMO:* Pri liečbe kombinovanej spasticity horných a dolných končatín u detí vo veku 2 roky alebo starších sa treba riadiť dávkovaním pri jednotlivých indikáciách, t. j. liečba fokálnej spasticity horných končatín alebo dynamickej deformity nohy u pediatrických pacientov s DMO. *Spastická torticollis:* Iniciálna odporúčaná dávka je 500 U, podaná rozdelene do 2 alebo 3 najaktívnejších krčných svalov. Nižšia dávka je vhodná u pacientov so zmenšenou telesnou hmotnosťou a u starších pacientov, kde môže byť zmenšená svalová hmota. *Blefarospazmus a hemifaciálny spazmus:* Injekcia 10 U sa má podať mediálne a 10 U laterálne do spojenia medzi preseptálnou a orbitálnou časťou horného a dolného musculus orbicularis oculi každého oka. Za účelom zníženia rizika ptózy, je potrebné sa vyvarovať injekcie blízko musculus levator palpebrae superioris. Maximálna dávka nemá prekročiť celkovú dávku 120 U na jedno oko. *Axilárna hyperhidróza:* Odporúčaná počiatočná dávka je 100 U na podpazušie. Ak sa požadovaný efekt nedostaví, v opakovaných aplikáciách sa môže zvýšiť dávka až na 200 U. Liek sa má injikovať do 10 bodov intradermálne po 10 U. U palmárnej hyperhidrózy je celková dávka na jednu dlaň 120 U subkutánne, rozmiestnená do 6 rôznych miest, 20 U na jedno injekčné miesto. *Hyperfunkčné línie na tvári:* Dávku musí stanoviť lekár na základe svalovej sily a svalovej kinetiky pacienta. Aplikácia sa vykonáva intramuskulárne do svalu súvisiaceho s hyperfunkčnou líniou. Odporúčaná dávka 50 U sa musí rozdeliť do 5 injekčných miest. 10 jednotiek je nutné intramuskulárne aplikovať do každého z piatich miest. Aby nedošlo k ptóze, je nutné vyhnúť sa injekciám do oblasti levator palpebrae superoris. **KONTRAINDIKÁCIE:** precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. **OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ:** u pacientov liečených terapeutickými dávkami sa môže vyskytnúť nadmerná svalová slabosť. Riziko výskytu týchto nežiaducich účinkov (NÚ) môže byť znížené použitím najnižšej účinnej dávky a neprekročením maximálnej odporúčanej dávky. Liek sa má použiť s opatrnosťou pod prísnym dohľadom u pacientov so subklinickými alebo klinickými známkami zistiteľnej poruchy neuromuskulárneho prenosu. Dysport sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s už existujúcimi problémami s prehĺtaním alebo dýchaním, nakoľko tieto sa môžu zhoršiť a následne rozšíriť účinok toxínu do príslušných svalov. Zriedkavo sa pozorovala aspirácia a je rizikom pri liečbe pacientov s chronickým respiračným ochorením. Pri liečbe fokálnej spasticity postihujúcej dolné končatiny je potrebná opatrnosť najmä u starších pacientov, ktorí môžu byť vystavení vyššiemu riziku pádu. Liek obsahuje ľudský albumín - riziko prenosu vírusovej infekcie po použití ľudskej krvi alebo prípravkov z krvi sa nemôže vylúčiť s absolútnou istotou. *Použitie u detí:* Je potrebná mimoriadna opatrnosť pri liečbe pediatrických pacientov s výraznou neurologickou poruchou, dysfágiou alebo s nedávnou anamnézou aspiračnej pneumónie alebo pľúcnym ochorením. *Predávkovanie:* Nadmerné dávky môžu spôsobiť vzdialenú a hlbokú neuromuskulárnu paralýzu. *Gravidita a laktácia:* Liek sa má použiť počas gravidity iba pokiaľ prínos prevýši akékoľvek potenciálne riziko pre plod. Použitie počas laktácie sa neodporúča. *Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:* Existuje potenciálne riziko svalovej slabosti alebo poruchy zraku, ktorá, pokiaľ sa vyskytne, môže dočasne narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. **LIEKOVÉ A INÉ INTERAKCIE:** účinky botulotoxínu sa umocňujú u liekov interferujúcich priamo alebo nepriamo s neuromuskulárnou funkciou (svalové relaxanciá tubokurarínového typu a aminoglykozidové antibiotiká), a takéto lieky sa majú používať s opatrnosťou u pacientov liečených botulotoxínom. **FERTILITA, GRAVIDITA A LAKTÁCIA:** komplex botulotoxínu typu A s hemaglutinínom má byť použitý počas gravidity iba pokiaľ prínos prevýši akékoľvek potenciálne riziko pre plod. Použitie komplexu botulotoxín typu A - hemaglutinín počas laktácie sa neodporúča. **NEŽIADUCE ÚČINKY:** hlásené u dospelých: dysfágia, sucho v ústach, svalová slabosť, ptóza, bolesť hlavy, celková slabosť, únava, príznaky podobné chrípke, reakcie v mieste vpichu, kostrová a svalová bolesť, bolesť v končatine, pád, závrat, faciálna paréza, zahmlené videnie, zníženie zrakovej ostrosti, dysfónia, dýchavičnosť bolesť krku, bolesť rúk a prstov, stuhnutosť kostrovej a svalovej sústavy, diplopia, suché oko, zvýšené slzenie, edém viečka, astenopia; hlásené v pediatrickej populácii: svalová bolesť, svalová slabosť, inkontinencia moču, chrípke podobné ochorenie, reakcia v mieste vpichu, poruchy chôdze, únava, pád, vyrážka. **DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII:** Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francúzsko. Registračné číslo: 63/0188/14-S (300 U), 63/0060/91-S (500 U). Dátum revízie textu: máj 2020. **Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku.** Akékoľvek podozrenie na nežiaduce účinky môžete hlásiť na tel: + 421 2 507 01 206 alebo e-mail: *neziaduce.ucinky@sukl.sk*. Táto skrátená informácia o lieku je určená pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese: *www.sukl.sk*.

LITERATÚRA: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Dysport, dátum poslednej revízie textu: 05/2020.

Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť.

DYS-SK-000092 Dátum prípravy: február 2022

IPSEN
Innovation for patient care

Ipsen Pharma, organizačná zložka,
Eurovea Central I, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovakia
www.ipsen.sk

Dysport®
ABOBOTULINUM TOXIN A

51. SLOVENSKÝ A ČESKÝ

CEREBROVASKULÁRNY KONGRES

Predseda vedeckého výboru:
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Čestný predseda:
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.

Vedecký a programový výbor:
prof. MUDr. Michal Bar, PhD., FESO
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN
prof. MUDr. Roman Herzig, PhD., FESO, FEAN
MUDr. Ján Kothaj
MUDr. Martin Kovář
MUDr. Georgi Krastev, PhD.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
MUDr. Miroslav Mako
prof. MUDr. Robert Mikulík, PhD., FESO
MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.
MUDr. Petra Reková
MUDr. Dagmar Součková
prof. MUDr. Daniel Šaňák, PhD., FESO
MUDr. Ondřej Škoda, PhD.
prof. MUDr. David Školoudík, PhD., FESO, FEAN
MUDr. Martin Šrámek
doc. MUDr. Aleš Tomek, PhD., FESO
MUDr. Daniel Václavík, PhD.

Organizačný sekretariát:
Ing. Helena Šurinová
Mobil: 0910 230 209, e-mail: surinova@amedi.sk
A-medi management, s. r. o., Jarošova 1, Bratislava 831 03

PROGRAM
Streda 8. 11. 2023

13:00 – 13:10 OTVORENIE KONGRESU

13:10 – 13:50 Starostlivosť o pacientov s CMP v SR a ČR

Predsedníctvo: Nosáľ V., Tomek A.

Starostlivosť o CMP na Slovensku v roku 2022 **15+5‘**
Nosáľ V., Cvopová A., Mišík M. (Martin, Bratislava)

Stav péče o CMP v ČR 2022 **15+5‘**
Tomek A. (Praha)

13:50 – 14:10 ANGELS OCENENIA

14:10 – 14:30 PRESTÁVKA

14:30 – 15:20 Cievne anomálie a invazívne postupy I

Predsedníctvo: Kurča E., Kozák J.

Cievne malformácie: postavenie mikrochirurgie v terapeutickom algoritme a klinická prax **15+5‘**
Kozák J., Liška M. (Bratislava)

Artériovenózna malformácia dominantného operkula na podklade syndrómu Rendu-Osler-Weber: ilustračná kazuistika a sumarizácia aktuálnych dát **12+3‘**
Buvala J., Šteňo J., Bízik I., Šteňo A. (Bratislava)

Embolizácia prasknutej piálnej infratentoriálnej AVM v tehotenstve **12+3‘**
Kurča E., Zeleňák K., Šalát D., Kolarovszki B., Zeleňáková J., Kocer N. (Martin, Trnava, Istanbul)

15:20 – 15:40 PRESTÁVKA

15:40 – 17:00 Cievne anomálie a invazívne postupy II

Predsedníctvo: Šteňo A., Kovář M.

Manažment asymptomatických intrakraniálnych aneuryziem, odporúčania ESO **15+5‘**
Petrovičová A. (Nitra)

Možnosti využitia navigovaného 3D-ultrazvuku počas mikrochirurgického ošetrenia mozgových aneuryziem **15+5‘**
Šteňo A., Buvala J., Malchárková S., Mižičková M., Bažík R., Mikula P., Bízik I., Šteňo J. (Bratislava)

Dekompresivní kraniektomie pro maligní edém mozku u pacientů s mechanickou trombektomií pro cévní mozkovou příhodu **15+5‘**
Černík D., Neradová J., Hliněná V., Cihlář F., Cihlář D., Brušáková Š. (Ústí nad Labem)

EC-IC bypass zlepšuje kognitivní výsledky pacientů s uzávěrem ACI a vyčerpanou cerebrovaskulární rezervou **15+5‘**
Kovář M., Krámská L., Šroubek J., Vojík J. (Praha)

17:00 – 17:20 PRESTÁVKA

17:20 – 17:40 Budúcnosť bez dymu **15+5‘**
Vámošová J. (Bratislava)
Prednáška podporená spoločnosťou Phillip Morris Slovakia s.r.o.

17:40 – 18:40 Klinicko – psychologický blok

Predsedníctvo: Slavkovská M., Grossmann J.

Možnosti diagnostiky kognitívneho deficitu po NCMP **12+3‘**
Vytykáčová S., Lohazerová K., Szeliga P. (Trnava)

Diferenciálna diagnostika kognitívnych deficitov **12+3‘**
Slavkovská M. (Košice)

Koreláty lézií po NCMP s exekutívnymi deficitmi **12+3‘**
Grossmann J. (Martin)

Neuropsychologická rehabilitácia pacientov po NCMP **12+3‘**
Lohazerová K., Vytykačová S., Szeliga P. (Trnava)

19:00 VEČERA

Štvrtok 9. 11. 2023

9:00 – 10:00 Klinicko – logopedický blok

Predsedníctvo: Hrnčiarová B., Melišová M.

Súčasný pohľad na afázie – od rečových centier k jazykovým sieťam **12+3‘**
Hrnčiarová B., Frajková Ž. (Trnava)

Narušenie motorickej realizácie reči po NCMP – dyzartrie a apraxie **12+3‘**
Melišová M., Betková I. (Košice, Ružomberok)

Diagnostika dysfagie pomocí testu GUSS ICU **12+3‘**
Lasotová N., Solná G. (Brno, Praha)

Terapia dysfágie u pacientov po NCMP **12+3‘**
Frajková Ž., Hrnčiarová B. (Trnava)

10:00 – 10:20 PRESTÁVKA

10:20 – 11:20 Ischemické CMP

Predsedníctvo: Mako M., Šrámek M.

IVT u pacientů s nízkym NIHSS **15+5‘**
Šrámek M. (Praha)

Trombektomie s nízkým ASPECTS **15+5‘**
Kovář M. (Praha)

Mechanická trombektómia oklúzie mozgových tepien stredného kalibru **10+2‘**
Mako M. (Trnava)

Prínos IVT v liečbe akútnej oklúzie a. centralis retinae **7+1‘**
Maksymets A., Mako M., Krastev G., Haring J. (Trnava)

11:20 – 11:40 PRESTÁVKA

11:40 – 12:40 Interdisciplinárny pohľad na antikoagulačnú liečbu v sekundárnej prevencii CMP

Predsedníctvo: Gdovinová Z.

Včasná iniciácia antikoagulácie – klinické skúsenosti **15+5‘**
Gdovinová Z. (Košice)

Pokroky v prevencii kardioembolických CMP **15+5‘**
Šóošová I. (Bratislava)

Reiniciácia antikoagulačnej terapie po CMP **15+5‘**
Viszlayová D. (Nové Zámky)
Sympózium podporené farmaceutickou spoločnosťou Pfizer

12:40 – 13:40 OBED

13:40 – 15:10 Rekanalizačná liečba

Predsedníctvo: Školoudík D., Krivošík M.

Sonolysis in revention of brain infarctions during internal carotid endarterectomy (SONOBIRDIE): Výsledky radnomizované studie **15+5‘**
Školoudík D., Hrbáč T., Herzig R., Fiedler J., Kovář M., Beneš V., Tomek A, Beneš V. ml., Nosáľ V., Voško M., Brozman M., Rossel J.B., Netuka D.; SONOBIRDIE Trial Group (Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Praha, Martin, Linz, Nitra, Bern)

Perfúzne CT a jeho úloha v rozhodovacom procese **15+5‘**
Krivošík M., Mikula P., Matejíková J., Straka I. (Bratislava)

Korelace CT perfúze a výsledného klinického stavu u mechanické rekanalizace ischemického iktu **15+5‘**
Václavík D. (Ostrava)

Oklúzia arteria basilaris **12+3‘**
Mako M. (Trnava)

Algoritmus rekanalizační léčby ischemické CMP u dětí **12+3‘**
Schwabová Paulasová J. (Praha)

15:10 – 15:30 PRESTÁVKA

15:30 – 16:30 Spasticita

Predsedníctvo: Minár M., Haring J.

Spastická paréza po cievnej mozgovej príhode **15+5‘**
Minár M. (Bratislava)

Využitie botulotoxínu v liečbe spastickej parézy **15+5‘**
Haring J., Števková Z., Daniš M., Krastev G. (Trnava)

Liečba spastickej parézy po mozgovej príhode v reálnej klinickej praxi **15+5‘**
Viszlayová D. (Nové Zámky)
Prednášky podporené farmaceutickou spoločnosťou IPSEN

16:30 – 16:50 PRESTÁVKA

16:50 – 18:40 Cerebrovaskulárne ochorenia

Predsedníctvo: Petrovičová A., Herzig R.

Katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene, stále málo využívaná alternatíva antikoagulačnej liečby. **15+5‘**
Mišíková S. (Košice)

Rizikové faktory a možnosti detekcie fibrilácie predsiení **15+5‘**
Kmec J. (Prešov)

Spontánní intracerebrální hemoragie – jaký má být management v roce 2023? **15+5‘**
Herzig R. (Hradec Králové)

Management spontánních intrakraniálních hemoragií – jak to děláme v klinické praxi **12+3‘**
Weiss V. (Hradec Králové)

Následná starostlivosť po CMP **15+5‘**
Gdovinová Z. (Košice)

Vaskulárne ochorenia u pacientov so sclerosis multiplex **12+3‘**
Krivošík M., Slezáková D. (Bratislava)

19:00 VEČERA

Piatok 10. 11. 2023

8:30 – 9:55 Varia

Predsedníctvo: Kmetonyová S., Kothaj J.

Prediktory zachování průchodnosti karotického stentu v časné fázi po endovaskulární léčbě tandemové léze v přední cirkulaci – výsledky studie ASCENT **12+3‘**
Černík D., Havlíček R., Šaňák D., Neradová J., Leško N., Gdovinová Z. (Ústí nad Labem, Praha, Olomouc, Košice)

Vaskulitis CNS – doporučený postup a soubor pacientů FN Motol **15+5‘**
Kmetonyová S. (Praha)

Fibromuskulárna dysplázia u 19-ročnej pacientky (kazuistika) **12+3‘**
Gregová Z., Dvorák M. (Spišská Nová Ves)

Intraarteriální podání eptifibatidu může být účinnou a bezpečnou součástí endovaskulární léčby akutní ischemické příhody **12+3‘**
Černík D., Neradová J., Hliněná V., Cihlář F. (Ústí nad Labem)

Vaskulitídy CNS – výzva pre neurológa **15+5‘**
Kothaj J. (Banská Bystrica)

9:55 – 10:15 PRESTÁVKA

10:15 – 11:25 Sekundárna prevencia

Predsedníctvo: Krastev G., Dluhá J.

Analýza účinnosti a bezpečnosti skorého nasadenia antitrombotickej sekundárnej prevencii u pacientov po iv trombolytickej liečbe rt-PA pre akútnu iCMP **15+5‘**
Krastev G., Mako M., Jakubcová D., Havranová R., Andrašíková K. (Trnava)

Plazmatické hladiny priamych perorálnych antikoagulancií u pacientov s fibriláciou predsiení v čase embolickej cievnej mozgovej príhody: pilotná prospektívna multicentrická štúdia **12+3‘**
Dluhá J., Nosáľ V., Kurča E., Babálová L., Sivák S., Petrovičová A., Samoš M., Bolek T., Hajaš G., Mokáň M., Staško J., Kubisz P., Stančiaková L. (Martin, Nitra)

Monitorovanie plazmatických hladín priamych perorálnych antikoagulancií **12+3‘**
Babálová L., Žideková N., Kertys M., Pršo K., Brisudová K., Bolek T., Sivák Š., Kurča E., Mokrý J., Samoš M., Nosáľ V. (Martin)

„Známy-neznámy rivaroxaban u pacientov s fibriláciou predsiení“ **15+5‘**
Olexa P. (Košice)
Prednáška podporená farmaceutickou spoločnosťou Viatris

11:25 – 11:45 PRESTÁVKA

11:45 – 13:25 Varia 2

Predsedníctvo: Petrovičová A., Černík D.

Progredujúci lakunárny infarkt **15+5‘**
Petrovičová A. (Nitra)

Vplyv celkovej anestézie a sedácie počas endovaskulárnej liečby CMP na výsledný „outcome“ pacientov **15+5‘**
Cisár J., Krastev G., Mako M., Haring J. (Trnava)

Klinický výsledek mechanické trombektomie u cévní mozkové příhody před, v průběhu a po pandemii Covid-19 **12+3‘**
Černík D., Neradová J., Hliněná V., Cihlář F. (Ústí nad Labem)

Závažná hypofibrinogenémia ako komplikácia intravenóznej trombolýzy u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou **12+3‘**
Gašpareková V., Petrovičová A., Hajaš G. (Nitra)

Nonkonvulsivní status epilepticus u pacientů s CMP **12+3‘**
Šarbochová I., Fábera P., Krýsl D., Marusič P., Tomek A. (Praha)

Akútna bilaterálna oklúzia arteria carotis interna – kazuistika **12+3‘**
Segľová J., Bulecová H., Daňová M., Klč J. (Prešov)

13:25 ZÁVER PODUJATIA

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity CME.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

	po 15. 10. 2023 a na mieste
Člen ČNS, SNeS, ČSKN, SSKN	120,- EUR
Nečlen ČNS, SNeS, ČSKN, SSKN	130,- EUR
Sestra člen SKSaPA	30,- EUR
Sestra, Laborant	40,- EUR

SPÔSOB PLATBY

- **prevodom na účet (prosíme uhradiť do 15. 10. 2023)**
  - majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
  Banka: UniCredit Bank | Variabilný symbol: 33081123
  SWIFT: UNCRSKBX | IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
  Poznámka: meno účastníka
- **v hotovosti alebo kartou pri registrácii**

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.

SPOLOČENSKÁ ČASŤ KONGRESU:

Streda – 8. 11. 2023, od 19.00 hod.
- Večera – Grandhotel Bellevue

Štvrtok – 9. 11. 2023, od 19.00 hod.
- Spoločné posedenie – Grandhotel Bellevue

INÉ POPLATKY

Večera	**8. 11. 2023**	**30 €**
Obed	**9. 11. 2023**	**20 €**
Spoločenské posedenie	**9. 11. 2023**	**50 €**
Obed	**10. 11. 2023**	**20 €**

Hlavný partner

Pfizer

Partneri

angels
ZANECHAJTE ZA SEBOU STOPU

AMIREX, a.s.

Boehringer Ingelheim

BRAINOMIX

EVER PHARMA

IPSEN
Innovation for patient care

PMI SCIENCE
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

SANOMED

SCHWABE

GEDEON RICHTER

VIATRIS™

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

Actilyse® alteplasum

Konajte RÝCHLO

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,
o.z. Landererova 12 Bratislava 811 09 SR
e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Názov lieku: Actilyse 20 mg, Actilyse 50 mg. **Zloženie lieku:** 20 mg alteplázy (čo zodpovedá 11 600 000 IU) alebo 50 mg alteplázy (čo zodpovedá 29 000 000 IU). **Lieková forma:** prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok. **Indikácie:** Trombolytická liečba pri akútnom infarkte myokardu, trombolytická liečba pri akútnej masívnej pľúcnej embólii s hemodynamickou nestabilitou, fibrinolytická liečba náhlej ischemickej cievnej mozgovej príhody. Liečba sa musí začať čo najskôr v priebehu 4,5 hodín po nástupe príznakov cievnej mozgovej príhody a po vylúčení intrakraniálneho krvácania použitím vhodných zobrazovacích metód (napr. počítačovou tomografiou hlavy alebo inou diagnostickou zobrazovacou metódou citlivou na prítomnosť krvácania). Účinok liečby závisí od času, preto skoršia liečba zvyšuje pravdepodobnosť priaznivého výsledku liečby. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Actilyse sa má podať čo najskôr po nástupe príznakov. Dávkovacie schémy si pozrite v Súhrne charakteristických vlastností lieku. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na liečivo alteplázu, gentamycín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku, pre ďalšie kontraindikácie si pozrite Súhrn charakteristických vlastností lieku. **Osobitné upozornenia:** Za účelom zlepšiť sledovateľnosťť biologických liekov sa má názov lieku a číslo šarže podávaného lieku zrozumiteľne uviesť do záznamov pacienta. Vhodná sila lieku altepláza sa má zvoliť starostlivo a podľa plánovaného použitia. Trombolytická/fibrinolytická liečba si vyžaduje adekvátny monitoring, ďalšie osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní si pozrite v Súhrne charakteristických vlastností lieku. **Liekové interakcie:** Nevykonali sa žiadne formálne interakčné štúdie s Actilyse a liekmi, ktoré sa bežne podávajú pacientom s akútnym infarktom myokardu. Lieky ovplyvňujúce koaguláciu/funkciu trombocytov: riziko krvácania sa zvyšuje pri podávaní kumarínových derivátov, perorálnych antikoagulancií, inhibítorov agregácie trombocytov, nefrakcionovaného heparínu alebo LMWH alebo aktívnych substancií ovplyvňujúcich koaguláciu. ACE inhibítory: súbežná liečba inhibítormi ACE môže zvyšovať riziko vzniku reakcie z precitlivenosti, GPIIb/IIIa antagonistov. **Nežiaduce účinky:** Najčastejšou nežiaducou reakciou spojenou s Actilyse je krvácanie v rôznych formách, ktoré vedie k poklesu hematokritu a/alebo hodnôt hemoglobínu. Veľmi časté: intracerebrálne krvácanie, všetky krvácania vrátane krvácaní uvedených v tejto tabuľke, napr. ICH a ne-ICH, rekurentná ischémia/angína pektoris, hypotenzia a srdcové zlyhanie/edém pľúc. Pre ďalšie nežiaduce účinky si pozrite Súhrn charakteristických vlastností lieku. **Čas použiteľnosti:** Neotvorené injekčné liekovky: 3 roky. Rekonštituovaný roztok sa preukázal ako stabilný po dobu 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C a 8 hodín pri teplote 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má prípravok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za dobu a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne nemá byť dlhšia ako 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C. **Uchovávanie:** uchovávať pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. **Držiteľ rozhodnutia o registrácií:** Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim nad Rýnom, Nemecko. **Dátum revízie textu:** Október 2022

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej adrese.
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com

Boehringer Ingelheim

PC-SK-102016 Dátum vydania: november 2023

ELIQUIS preukázal **účinnosť aj bezpečnosť** v celom spektre indikácií [1]

FP – fibrilácia predsiení, HŽT – hlboká žilová trombóza, PE – pľúcna embólia, VTE – venózny tromboembolizmus, CMP – cievna mozgová príhoda

Eliquis® apixabán

Pred podaním lieku sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku Eliquis (SPC), ktorý môžete na vyžiadanie získať od zástupcov spoločnosti Pfizer.

SPC lieku Eliquis môžete na vyžiadanie získať od zástupcov spoločnosti Pfizer, alebo naskenovaním QR kódu. SPC lieku Eliquis je dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk po zadaní názvu lieku do políčka vyhľadávača. Táto informácia o lieku je určená osobám oprávneným predpisovať alebo vydávať lieky. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie je potrebné hlásiť na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: +421 2 507 01 206, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk, formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ alebo miestnemu zástupcovi držiteľa rozhodnutia o registrácii humánneho lieku: spoločnosti Pfizer Luxembourg SARL, o. z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, e-mail: SVK.AEReporting@pfizer.com.

Literatúra: 1. ELIQUIS (apixabán) Súhrn charakteristických vlastností. Dátum poslednej revízie textu: máj 2023. Dostupný na: https://ema.europa.eu.

PP-ELI-SVK-0405, Dátum schválenia : September 2023

Pfizer

PFIZER Luxembourg SARL, o.z.,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/33 55 55 00, www.pfizer.sk