

Slovenská lekárska spoločnosť  
Slovenská gynekologicko-pôrodná spoločnosť  
Slovenská urologická spoločnosť



## III. konferencia gynekológov a urológov

**Wellness hotel Grand\*\*\*\* Jasná**  
**28.–29. október 2016**

### **VEDECKÝ VÝBOR**

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.  
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.  
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

### **ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT**

Ing. Dana Lakotová  
A-medi management, s.r.o.  
Stromová 13, 831 01 Bratislava  
+421 903 224 625  
+421 2 556 472 47  
marketing@amedisk



# Alpha D<sub>3</sub> 1μg

alfakalcidol

## Slnko na každý deň

Takmer 50% zdravých  
premenopauzálnych slovenských  
žien má hladinu aktívneho  
D-hormónu nízku<sup>1</sup>

### Nedostatočná hladina aktívneho D-hormónu

- znižuje absorpciu vápnika  
z tenkého čreva<sup>1,2</sup>
- zvyšuje odbúravanie vápnika  
z kostí<sup>1,2</sup>

Alpha D<sub>3</sub>  
alfakalcidol

- optimalizuje hladinu aktívneho D-hormónu v organizme<sup>3</sup>
- zabezpečuje optimálne vstrebávanie vápnika z potravy<sup>3</sup>
- redukuje osteoklastickú resorpciu kostí<sup>3</sup>
- stimuluje osteoblastickú formáciu kostí<sup>3</sup>
- chráni ženu v menopauze pred stratou kostnej hmoty vo vertebrálnej oblasti<sup>2</sup>

#### Skrátená informácia o lieku

**Názov lieku:** ALPHA D3 0,25 μg / 0,5 μg / 1 μg. **Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie:** Alfakalcidol, 0,25 μg / 0,5 μg / 1 μg. **Lieková forma:** Mäkké kapsuly. **Liekové indikácie:** Renálna osteodystrofia so zníženou absorpciou vápnika, osteomalácia, osteoporóza, najmä postmenopauzálna, senilná a osteoporóza spôsobená liečbou glukokortikoidmi, prídavná liečba pri hypoparatyreóze, hypostatiemickej rachitíde/osteomalácii. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Počiatočná denná dávka pre dospelých a deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 20kg je 1 μg alfakalcidolu, pri dlhodobej liečbe sa má dávka znižovať v závislosti od zlepšovania klinického stavu. Jednorazová denná dávka sa podáva perorálne, je vhodné užiť večer. Ak je dávka rozdelená na dve častkové dávky, užíva sa ráno a večer. **Kontraindikácie:** Známa precitlivosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok, manifestná intoxikácia vitamínom D, hyperkalcémia, hypermagneziémia, alergia na arašidy alebo sóju. **Osobitné upozornenia:** Počas terapie monitorovať hladinu vápnika a fosfátov v krvi. **Liekové a iné interakcie:** súběžne sa nemá podávať vitamín D a jeho deriváty. Zmena dávkovania ALPHA D3 je pri súběžnej liečbe barbiturátmi alebo antikonvulzívmi indukujúcimi pečevňové enzýmy. Difenyhydantoin môže celkom inhibovať účinnosť alfakalcidolu. Glukokortikoidy, tiež lieky, ktoré obsahujú cholestyramín, sukralfát alebo antacidá a estrogény môžu ovplyvňovať účinnosť alfakalcidolu. Pacienti užívajúci súčasne digitális a ALPHA D3 majú byť pod zvýšeným dohľadom lekára. Pri súběžnej liečbe prípravkami obsahujúcimi vápnik alebo tiažidy je zvýšené riziko hyperkalcémie. **Gravidita a laktácia:** V období gravidity a laktácie používať liek len v nevyhnutných prípadoch. **Nežiaduce účinky:** Pri hyperkalcémii sa môže vyskytnúť únava, gastrointestinálne symptómy, smäd, svrbenie. Počas terapie alfakalcidolom sa len zriedka objavilo mierne a dočasné zvýšenie hladín fosfátov v krvi. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. **Dátum poslednej revízie textu:** Január 2016. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Úplná informácia o lieku je dostupná na [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v Súhrne charakteristických vlastností lieku alebo ju získate na adrese: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel: +421 2 5726 7911, [www.teva.sk](http://www.teva.sk)

#### Literatúra:

1. Stecová A. a spol: Koncentrácie vitamínu D u premenopauzálnych žien na Slovensku. Laboratórna diagnostika 1-2/2009.
2. Reginster JY, Lecart MP, Richy J. Importance of Alfakalcidol in Clinical Conditions Characterized by High Rate of Bone Loss. J. Rheumatol 2005;32 Suppl 76:21-25.
3. Ringe JD, Schaft E. Prevention and Therapy of Osteoporosis: The Roles of Plain Vitamin D and Alfakalcidol. Rheumatol Int 2004; 24:189-197.
4. [www.health-od-writer.com](http://www.health-od-writer.com)

Byť prvý, znamená viac pomáhať

**TEVA**

TEVA PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.

**13,00 – 14,00 Registrácia****14,00 – 16,00 Odborný program**

*Predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., MUDr. Martin Romančík, PhD.*

1. Švihra, J.: **Medikamentózna liečba stresovej inkontinencie moču** .....40 min.  
*Prednáška podporená grantom spol. KRKA*
2. Porru, D.: **Vulvodynia: causes, current treatments and new Perspectives** .....30 min.
3. Bartl, I.: **Intravezikulárna terapia cystitíd z pohľadu urológa a sexuológa**.....20 min.
4. Ľuník, R.: **Diklofenak v súčasnej ambulantnej praxi – čím nás ešte môže prekvapiť?** .....15 min.
5. Reismullerová, L.: **Klinické skúsenosti s liečbou mužskej neplodnosti exogénnym FSH na základe FSRH genotypu** .....15 min.  
*Prednášky podporené grantom spol. IBSA*

**16,00 – 16,15 Prestávka****16,15 – 18,15 Odborný program**

*Predsedníctvo: doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., CSc., MUDr. Igor Bartl*

1. Bartl, I.: **Nové poznatky o vplyve dávkovania antioxidantov a myo-inositolu na fertilitu muža** .....30 min.
2. Urdzík, P.: **Využitie fosfomycínu v ambulantnej praxi**.....30 min.  
*Prednášky podporené grantom spol. EXELTIS*
3. Švihra, J.: **Moderná liečba hyperaktívneho močového mechúra BOTOXom**.....20 min.  
*Prednáška podporená grantom spol. ALLERGAN SK s.r.o.*
4. Brenišin, P.: **Znamená každá dysuria infekciu močových ciest?** .....15 min.
5. Kliment, M.: **Nové miesto vitamínu D v gynekologickej praxi** .....15 min.
6. Černáková, I., Dúbravický, J., Petrovič, R., Fischerová, M.: **Význam komplexného andrologicko - genetického vyšetrenia spermíí v manažmente liečby mužskej infertility** ..... 10 min.

**20,00 Spoločenský večer**

**9,00 – 10,30 Odborný program**

*Predsedníctvo: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., MUDr. Martin Hrivňák*

1. Redecha, M.: Situácia s HPV asociovanými ochoreniami ..... 10 min.
2. Weismannová, E.: Možnosti laboratórnej diagnostiky HPV .....15 min.
3. Jeseňák, M.: Očkovacie látky a ich význam v prevencii .....20 min.
4. Kotek, M.: HPV infekcia v gynekológii a úloha lekára v ich prevencii ....15 min.
5. Hrivňák, M.: HPV infekcie v urológii a ich prevencia.....15 min.
5. Škutilová, E.: Pohľad dermatológa na ochorenia súvisiace s HPV .....15 min.

**10,30 – 11,00 Prestávka****11,00 – 13,00 Odborný program**

*Predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.*

1. Javorka, K.: Vezikorenálny reflux .....15 min.
2. Jonáš, M.: Endoskopická liečba vezikorenálneho refluxu .....15 min.
3. Molčan, J.: Chirurgická liečba vezikouretrálneho refluxu.....15 min.
4. Záhumenský, J.: Kolonizácia permanentných katétrov  
u pacientok s plánovaným a akútnym cisárskym rezom.....15 min.
5. Hudec, B., Bielik T.: Spolupráca urológa a gynekológa pri liečbe  
hlbokoinfiltrujúcej endometriózy .....15 min.
6. Sopilko, I.: Varikokéla .....15 min.
7. Jonáš, M.: Konzervatívna liečba fimózy.....15 min.
8. Javorka, K.: Enuréza .....15 min.

**13,00 Obed**

## MIESTO KONANIA

Wellness hotel Grand\*\*\*\* Jasná  
Demänovská Dolina 71  
Liptovský Mikuláš 1  
031 01

## REGISTRAČNÝ POPLATOK

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Členovia SGPS a SUS do 20.09.2016 | 40 € |
| Členovia SGPS a SUS od 21.09.2016 | 50 € |
| Členovia SGPS a SUS na mieste     | 60 € |
| Nečlenovia do 20.09.2016          | 50 € |
| Nečlenovia od 21.09.2016          | 60 € |
| Nečlenovia na mieste              | 70 € |

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet,  
po dodržaní stanovených termínov.

## SPÔSOB PLATBY REGISTRAČNÉHO POPLATKU

- v hotovosti pri registrácii
- prevodom na účet:

## BANKOVÉ SPOJENIE NA ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU

**Názov účtu:** Slovenská gynekologicko-pôrodná spoločnosť  
Tatrabanka a.s., Bratislava  
**SWIFT:** TATR SK BX  
**IBAN:** SK 48 1100 0000 0026 6345 5128  
**Číslo účtu:** 2663455128/1100  
**Variabilný symbol:** 281016  
**Konštantný symbol:** 0558

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy

## INÉ POPLATKY

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Spoločenský večer 28.10.2016</b><br><i>Hotel Grand – kongresová sála</i> | <b>15 €</b> |
| <b>Obed 29.10.2016</b><br><i>Hotel Grand – reštaurácia</i>                  | <b>10 €</b> |

## POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.  
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

### Pasívna účasť:

|            |           |
|------------|-----------|
| 28.10.2016 | 4 kredity |
| 29.10.2016 | 3 kredity |

### Aktívna účasť:

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| zahraničný autor prednášky                     | 15 kreditov |
| zahraničný spoluautor prednášky (prvých dvaja) | 10 kreditov |
| domáci autor prednášky                         | 10 kreditov |
| domáci spoluautor prednášky (prvých dvaja)     | 5 kreditov  |

## UBYTOVANIE - Wellness hotel Grand\*\*\*\* Jasná

Zabezpečuje spoločnosť A-medi management, Mgr. Klára Steiningerová  
Ubytovanie je možné rezervovať:

- mailom na [steiningerova@amedisk.sk](mailto:steiningerova@amedisk.sk)
- telefonicky na **0911 038 002**

## CENNÍK UBYTOVANIA

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Jednolôžková izba | 95 €  |
| Dvojlôžková izba  | 110 € |

## GENERÁLNY PARTNER



**Exeltis**  
Rethinking healthcare

## PARTNERI

ALLERGAN • ALPHA MEDICAL • AMIREX • BELLA SK • BENELA  
FERRING • IBSA • KLINICKÁ BIOCHÉMIA • KRKA • MEDAC • MSD  
PIERRE FABRE • PRO.MED.CS • SCA • SD PHARMA • SIEMENS  
S&T SLOVAKIA • SYNERGIA PHARMACEUTICALS S.R.O. • TEVA • VULM  
WEGA-MS

**Bližšie informácie na [www.amedisk.sk](http://www.amedisk.sk)**

# Nie všetky ženy chcú mať cyklus každý mesiac...

Predstavujeme vám Seasonique, prvú perorálnu hormonálnu antikoncepciu špeciálne vytvorenú tak, že žena má cyklus iba

**4**-krát ročne.



seasonique

levonorgestrel/etinylestradiol

etinylestradiol

0,15 mg/0,03 mg + 0,01 mg filmom obalené tablety

TEVA

Women's Health

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Január

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní spoločnosti Teva rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na [safety.sk@teva.sk](mailto:safety.sk@teva.sk).

## SKRÁTENÁ INFORMÁCIA LIEKU

**NÁZOV LIEKU:** Seasonique 0,15mg/0,03mg + 0,01 mg filmom obalené tablety. **ZLOŽENIE LIEKU:** Každá ružová filmom obalená tableta obsahuje 150 mikrogramov levonorgestrelu a 30 mikrogramov etinylestradiolu. Každá biela filmom obalená tableta obsahuje 10 mikrogramov etinylestradiolu. **LIEKOVÁ FORMA:** Filmom obalená tableta. **Terapeutické indikácie:** Perorálne kontraceptívum. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Seasonique je perorálna antikoncepcia s predĺženým režimom dávkovania, v rámci ktorého sa tablety užívajú nepretržite 91 dní, užíva sa 1 tableta denne. Balenie Seasonique pozostáva z 84 kombinovaných tablet obsahujúcich 150 mikrogramov levonorgestrelu a 30 mikrogramov etinylestradiolu a zo 7 tablet obsahujúcich 10 mikrogramov etinylestradiolu. Jedna ružová tableta obsahujúca levonorgestrel a etinylestradiol sa užíva denne počas 84 po sebe nasledujúcich dní a následne sa užíva jedna biela tableta obsahujúca etinylestradiol počas 7 dní, v priebehu ktorých zvyčajne dôjde ku krvácaniu z vysadenia. **Contraindikácie:** Prítomnosť alebo riziko vzniku venózne tromboembólie; prítomná alebo v anamnéze, známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik venózne tromboembólie, závažný chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou, vysoké riziko vzniku venózne tromboembólie z dôvodu prítomnosti viacerých rizikových faktorov. Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálnej tromboembólie; arteriálna tromboembólia - prítomná alebo v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom, cievné mozgové ochorenie - prítomná cievná mozgová príhoda alebo v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom, známa vrodená alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, migréna s ložiskovými neurologickými symptómami v anamnéze, vysoké riziko vzniku arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov alebo prítomnosti jedného závažného rizikového faktora. Pankreatitída spojená so závažnou hypertriglyceridémiou, závažné ochorenie pečene a nádory v prítomnosti alebo v anamnéze, preukázané alebo suspektne zhubné nádory závislé od pohlavných steroidov, diagnosticky neobjasnené vaginálne krvácanie, užívanie rastlinného prípravku s obsahom ľubovníka bodkovaného, precitlivosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Riziko vzniku venózne arteriálnej tromboembólie a zvýšené riziko tromboembólie v šiestonedeľ. Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sa spájajú s nežiaducimi vaskulárnymi príhodami, patria diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko uremický syndróm a chronické zápalové ochorenie čriev a kosáčikovitá anémia. Dôvodom na okamžité ukončenie užívania COC môže byť zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény počas užívania COC. U dlhodobých užívateľiek COC bolo hlásené tiež zvýšené riziko rakoviny krčka maternice. U užívateľiek COC v súčasnosti hlásené mierne zvýšené relatívne riziko diagnózy karcinómu prsníka, v zriedkavých prípadoch benigne nádory pečene a ešte v zriedkavejších prípadoch maligne nádory pečene. Ženy s hypertriglyceridémiou alebo s jej výskytom v rodinnej anamnéze môžu byť počas užívania COC vystavené zvýšenému riziku vzniku pankreatitídy. Akútne alebo chronické poruchy funkcie pečene si môžu vyžadovať prerušenie užívania COC. Počas užívania COC bolo hlásené zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Pred začatím alebo opätovným začatím užívania Seasonique treba odobrať kompletnú anamnézu, zmerať krvný tlak a vykonať fyzikálne vyšetrenie a musí sa vylúčiť gravidita. Tak ako pri každej COC, sa môže vyskytnúť nepravdivé krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), najmä počas prvých 3 mesiacov užívania. Tablety Seasonique obsahujú laktózu. Ružové tablety Seasonique obsahujú azofarbivá allura červená AC - hliníty lak (E129) a brilantová modrá FCF - hliníty lak (E133), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie. **Liekové a iné interakcie:** Interakcie medzi perorálnymi kontraceptívmi a inými liekmi môžu viesť k medzimenštruačným krvácaniam a/alebo k zlyhaniu antikoncepcie. Môže dôjsť k interakciám s liekmi, ktoré indukujú pečňové enzýmy (napr. fenytoinom, barbituráty, rifampicínom a iné), s liekmi proti HIV a pravdepodobne aj s oxkabarzepínom, topiramátom, felbamátom, grizeofulvínom a s rastlinnými prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného, ktoré môžu mať za následok zvýšený klírens pohlavných hormónov. Súbežné užívanie COC a lamotrigínu znižuje hladiny lamotrigínu. Užívanie COC môže zmeniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení, vrátane biochemických parametrov pečene, štítnej žľazy, nadobličiek a obličiek, plazmatických hladín proteínov, parametrov metabolizmu sacharidov a parametrov koagulácie a fibrinolýzy. Ženy, ktoré užívajú náhradnú liečbu hormónom štítnej žľazy, môžu potrebovať zvýšené dávky tohto hormónu. **Gravidita a laktácia:** Seasonique nie je indikovaný počas gravidity. Užívanie COC sa zvyčajne neodporúča, pokiaľ dojčiacia matka dieťa úplne neodstavi. **Nežiaduce účinky:** Veľmi časté: Metrorágia, Časté: Zmeny nálad, znížené libido, depresia, bolesť hlavy, migréna, nauzea, bolesť brucha, akné, menoragia, citlivosť prsníkov, dysmenorea, zvýšenie telesnej hmotnosti. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. **Dátum revízie textu:** 06/2016. Úplná informácia o lieku je dostupná na [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v Súhrne charakteristických vlastností lieku, alebo ju získate na adrese: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel.: +421 2 57 26 79 11, fax: +421 2 57 26 79 19, [www.teva.sk](http://www.teva.sk). Vydaj lieku je viazaný na lekárske predpis. Liek nie je hrađený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

SK/GEN/16/0084

NOVINKA



Exeltis  
Rethinking healthcare

# Afastural

granulát pre perorálny roztok **3 g**  
(Fosfomycinum trometamoli)

## Indikácie<sup>1</sup>:

- na liečbu akútnych nekomplikovaných infekcií dolných močových ciest u dospelých, vyvolaných patogénnymi citlivými na fosfomycín
- na periprocudurálnu profylaxiu pri diagnostických a chirurgických transuretrálnych zákrokoch

## Dávkovanie<sup>1</sup>:

- na liečbu nekomplikovaných infekcií dolných močových ciest: **jedno vrecko (3 g)**.
- v profylaxii pri transuretrálnych chirurgických a diagnostických zákrokoch: **jedno 3 g vrecko sa podáva 3 hodiny pred chirurgickým zákrokom a jedno 3 g vrecko 24 hodín po zákroku.**

## Použitie<sup>1</sup>:

- perorálne, nalačno, najlepšie večer pred spaním, po vyprázdnení močového mechúra. **Obsah vrecka sa musí rozpustiť v pohári vody a roztok sa má ihneď po jeho rozpustení vypiť.**

| ŠUKL kód | Názov        | Doplňok                                        | UZP od 1.7.2016 | Doplatok | MCV    | Konečná cena |
|----------|--------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 7764A    | AFASTURAL 3g | gro por 1x3 g<br>(vre.papier/<br>LDPE/Al/LDPE) | 3,05 €          | 1,02 €   | 2,52 € | 4,07 €       |

## Skrátená informácia o lieku:

**Názov lieku:** Afastural 3 g, granulát na perorálny roztok. **Zloženie:** Fosfomycín trometamol. Jedno vrecko obsahuje 5,631 g fosfomycínu trometamolu, čo zodpovedá 3 g fosfomycínu. **Lieková forma:** Biely sedaploý granulát vo vrecku s jednorazovou dawkou. **Terapeutické indikácie:** Afastural 3 g je indikovaný na liečbu akútnych nekomplikovaných infekcií dolných močových ciest u dospelých, vyvolaných patogénnymi citlivými na fosfomycín. Afastural 3 g je indikovaný na periprocudurálnu profylaxiu pri diagnostických a chirurgických transuretrálnych zákrokoch. **Dávkovanie:** Dospelí: Na liečbu nekomplikovaných infekcií dolných močových ciest: jedno vrecko (3 g). V profylaxii pri transuretrálnych chirurgických a diagnostických zákrokoch: jedno 3 g vrecko sa podáva 3 hodiny pred chirurgickým zákrokom a jedno 3 g vrecko 24 hodín po zákroku. **Pediatrická populácia:** Fosfomycín trometamol v dávke 3 g nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov. **Spôsob podávania:** Afastural 3 g sa užíva perorálne a má sa užívať nalačno, najlepšie večer pred spaním, po vyprázdnení močového mechúra. Obsah vrecka sa musí rozpustiť v pohári vody a roztok sa má ihneď po jeho rozpustení vypiť. **Starší pacienti a pacienti s poškodením obličiek:** Fosfomycín trometamol sa vylučuje z tela hlavne obličkami. Opätosť sa odporúča pri podávaní tohto antibiotika u pacientov s poruchou funkcie obličiek. **Kontraindikácie:** Predchádzajúca na liečbu alebo na kŕmky lieky z pomocných látok. Afastural 3 g je kontraindikovaný u pacientov so závažnou renálnou poruchou (CL<sub>cr</sub> < 10 ml/min) a pacientov podstupujúcich hemodialýzu. **Osobitné upozornenia:** Jedlo môže predlžovať absorpciu lieku, čo môže spôsobiť mierne zníženie maximálnych hladín lieku v krvi a v moči. Afastural 3 g sa má preto užívať nalačno 1 hodinu pred alebo aspoň 2 hodiny po jedle. Uchovávajúť mimo dosahu detí. S antibiotikami spojené kolitidy (vrátane pseudomembránovej kolitidy) boli hlásené v súvislosti s užívaním širokospektrálnych antibiotík, vrátane fosfomycínu trometamolu, preto je dôležité zväziť túto diagnózu u pacientov so závažnou hnačkou počas alebo po užití fosfomycínu trometamolu. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami intolerancie fruktózy, glukózy - galaktózy alebo insuficienciou sacharózy-izomaltázy by ho nemali užívať. **Liekové interakcie:** Pri súčasnom podaní metoprololom bolo pozorované zníženie serovej koncentrácie fosfomycínu, a jeho koncentrácie v moči, preto je potrebné sa uverejnej kombinácii liekov vyhnúť. **Gravidita a laktácia:** Fosfomycín by sa mal v tehotenstve používať len ak očakávaný prínos prevyšuje nad rizikom. Fosfomycín sa vylučuje do materského mlieka, treba zväziť, či je potrebné prerušiť dojčenie alebo prerušiť/ukončiť terapiu Afasturalom 3 g s prihliadnutím na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre matku. **Nežiaduce účinky:** časte: bolesť hlavy, závrat, dyspepsia, vukovaginitída, menšie časté poruchy trávenia, nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, vyrážka, žihľavka, pruritus, únava, zriedkavé: tachykardia, svrbenie. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Lade Pharma Slovakia, s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. **Registračné číslo:** 15/0430/13-S. **Datum revízie textu:** November 2015. **Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku. Pred predpisovaním, alebo výdajom lieku sa obozrňuje so súhrnom charakteristických vlastností lieku. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyziadanie alebo na stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk).**



[www.exeltis.com](http://www.exeltis.com)