



Liek Forxiga je možné indikovať u pacientov s eGFR \geq 25 ml/min/1,73 m² pri všetkých indikáciách bez limitu pre vysadenie¹

* Forxiga je indikovaná: - na liečbu dospelých pacientov pri nedostatočnej kontrole diabetes mellitus 2. typu ako prídavná liečba k diéte a k fyzickej aktivite, - dospelým pacientom na liečbu symptomatického chronického srdcového zlyhávania, - na liečbu chronickej choroby obličiek.

DM2T - diabetes mellitus 2. typu; CKD - chronická choroba obličiek; HFrEF - srdcové zlyhávanie so zníženou ejekčnou frakciou; eGFR - odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie; HF - srdcové zlyhávanie.

Liek Forxiga je možné indikovať pri všetkých indikáciách pri eGFR \geq 25 ml/min/1,73 m². U pacientov s diabetom je účinnosť dapagliflozínu na zníženie glykémie redukovaná, pokiaľ je rýchlosť glomerulárnej filtrácie (eGFR) < 45 ml/min, ak teda eGFR klesne pod 45 ml/min, je potrebné u týchto pacientov zvážiť eventuálne prídanie ďalšej antidiabetickej liečby.

Referencie: **1.** SPC lieku Forxiga, dostupné na www.sukl.sk. **2.** Zoznam kategorizovaných liekov, dostupný na: www.health.gov.sk. **3.** Jhund PS et al. Nat Med. 2022;28(9):1956-1964. **4.** Heerspink HJL et al. N Engl J Med. 2020; 383:1436-1446.

INFORMÁCIA O LIEKU FORXIGA 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY

TÁTO INFORMÁCIA O LIEKU JE URČENÁ OSOBÁM OPRÁVNENÝM PREDPISOVAŤ LIEKY A OSOBÁM OPRÁVNENÝM VYDÁVAŤ LIEKY. VÝDAJ LIEKU JE VIAZANÝ NA LEKÁRSKY PREDPIS S OBMEDZENÍM PREDPISOVANIA. PRED PREDPÍSANÍM SI PROSÍM PREŠTUDUJTE INFORMÁCIU O LIEKU.

Úplná informácia o lieku je k dispozícii v Súhrne charakteristických vlastností lieku dostupnom na adrese: AstraZeneca AB o.z., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, na stránke https://www.ema.europa.eu/sk/documents/product-information/forxiga-epar-product-information_sk.pdf alebo ju získate po oskenovaní tohto QR kódu:

