

Nutrilon AR

Patentovaná receptúra s karobovou gumou účinne znižuje frekvenciu a závažnosť regurgitácie²⁴



KARBOVÁ GUMA



Klinicky preukázané zníženie regurgitácie a refluxu.²⁴

POSTBIOTIKÁ



Kombinácia karbovej gumy a postbiotík pomáha udržať frekvenciu a zloženie stolice porovnateľné so zdravým dojčeným dieťaťom.²¹

PREBIOTIKÁ



Kombinácia prebiotík scGOS/lcFOS (9:1) a postbiotík vedie ku:

- ✓ zvýšenie výskytu prospešných baktérií v čreve dieťaťa (Bifidobacterium)²⁵
- ✓ zlepšenie celkového zloženia mikrobioty²⁵
- ✓ podporuje vlastnosti stolice bližšie ku dojčeným deťom²⁶

PRE VIAC POKOJNÝCH CHVÍL

Zlepšuje kvalitu života detí a ich rodín²¹



ZLEPŠENIE KVALITY SPÁNKU



POKOJNEJŠIE SPRÁVANIE DETÍ



ZNÍŽENIE STRESU, OBÁV A STRACHU U RODIČOV

Nutrilon NUTRITON

Jediný prípravok na trhu pre dojčené deti pri opakovanom grckaní**

- ✓ prídavok do materského mlieka s obsahom karbovej gumy pre dojčatá, ktoré grckajú
- ✓ neobsahuje lepok, laktózu ani bielkoviny kravského mlieka
- ✓ je možné ho pridať do odstriedaného materského mlieka, dojčenskej výživy a taktiež do špeciálnej dojčenskej výživy



Nutrilon LACTOSE FREE

Počiatočná dojčenská výživa bez laktózy, receptúra vhodná pre deti pri neznášanlivosti laktózy*** aj po prekonanom hnačkovom ochorení

- ✓ neznášanlivosť laktózy
- ✓ prechodná intolerancia
- ✓ hnačkové ochorenie



REFERENCIE: 1. Mahon J, et al. BMJ Open. 2017;7(11):e015594. 2. Glanville J, et al. BMJ Open. 2016;6(8):e01475. 3. Bellaiche M, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2021; 73: 579-585. 4. Vandenplas Y, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015; 61(5):531-7. 5. Data on File, Danone. 2023. 3 mesačné sledovanie efektu formulácie na zníženie epizód kolik u dojčiat do veku 6 mesiacov v ambulancii praktického pediatra v SR. n=160. 6. Schmelzle H, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;36(3):343-51. 7. Savino, et al. Acta Paediatr Suppl. 2005;94:120-4. 8. Veitl, et al. Ernährungsmag. 2000;234-20. 9. Savino F, et al. Eur J Clin Nutr. 2006;60(1304-10. Billeaud C, et al. Eur J Clin Nutr. 1990;44(8):577-583. 11. Tolia V, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1992;15(3):297-301. 12. Kanabar D, et al. J Hum Nutr Diet. 2001;14(5):359-363. 13. Rinne, et al. FEMS Immunol Med Microbiol. 2005;43(1):59-65. 14. Krol J, et al. JPN. 2005;40(1):36-42. 15. Scholtens PA, et al. World J Gastroenterol. 2014;20(37):13446-13452. 16. Kennedy, et al. American J Clin Nutr. 1999;70(5):920-927. 17. Chao H-C, Vandenplas Y. Dis Esophagus. 2007;20(2):155-160. 18. Vandenplas Y, et al. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2019;22(3):207-216. 19. Hegar B, et al. Acta Paediatr Int J Paediatr. 2009;98(7):1189-93. 20. Indrio F, et al. Benef Microbes. 2015;6(2):195-198. 21. Tounian P, et al. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2020;23(6):511-20. 22. Salvatore S, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2023;76(5):499. 23. Bellaiche M, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2023;76(5):505. 24. Wenzl, et al. J Pediatr. 2003;111e355-e359. 25. Tims S, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(52):N-O-013.884. 26. Rodriguez-Herrera, et al. Nutrients. 2019;11(7):1530. * Testovaná formula Bellaiche 2021, Salvatore 2023, a Bellaiche 2023 štúdie s karubinom, prebiotikami a postbiotikami. Tounian 2020 štúdie s karubinom a postbiotikami. ** IMS data. YTD 8/2022, anti-reflux market. ***Tento výrobok by nemali užívať dojčatá s galaktosémiou alebo alergiou na bielkovinu kravského mlieka. FGID- functional gastrointestinal disorders, funkčné gastrointestinálne poruchy

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

☎ 0800-601-600

✉ info@nutriklub.sk

🌐 www.nutriklub.sk

📘 Nutrilon Slovenská republika

Danone s.r.o. | Mlynské nivy 5 | 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov | **Dôležité upozornenie:** Dojčenie je pre dieťa to najlepšie a zdravé a vyvážené strava matky je pri dojčení veľmi dôležitá. Rozhodnutie nedočiť či prestať dočiť môže byť nevrátne. Počiatočná dojčenská výživa Nutrilon Lactose Free je určená deťom od narodenia, ak nemôžu byť dojčené. Dojčenská výživa by sa mala používať na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa a mali by sa zväčš aj jej finančné dopady. Pre zdravie dojčateľa je dôležité dôsledne dodržiavať odporúčaný postup prípravy a dávkovania a použitia dojčenskej výživy uvedený na obale. Prípravky Nutrilon Comfort & Colics, Nutrilon AR a Nutrilon Nutrition sú potraviny na osobitné lekárske účely a sú určené na diétny režim pri uvedených indikáciách, musia byť používané pod dohľadom lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch, na www.nutriklub.sk a na infolinke 0800 601 600. **MATERIÁL PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ - NEŠÍRIŤ NA LAICKÚ VEREJNOSŤ.** 09/2024. BF313417



Kompletné portfólio pri tráviacich ťažkostiach s riešením pre každé dieťa

Až u viac ako 50 % dojčiat bolo diagnostikovaných viac FGID naraz^{1,2}, z dôvodu prekrývajúcich sa príznakov³

GRCKANIE



INTOLERANCIA LAKTÓZY



ZÁPCHA A KOLIKA



K najčastejším tráviacim problémom patrí zápcha a kolika.

Kolikami trpí až 20% detí a zápchou 15%.⁴

JEDNO RIEŠENIE, DVOJNÁSOBNÁ ÚĽAVA



Nutrilon COMFORT & COLICS

Unikátna receptúra na úľavu **pri zápche a kolikách**




ZNÍŽENIE
VÝSKYTU KOLÍK⁵




ZLEPŠENIE KONZISTENCIE
A FREKVENCIE STOLICE^{6,7}



ZLEPŠENIE
GI SYMPTÓMOV⁸



ZLEPŠENIE
SPÁNKU⁵



ZNÍŽENIE POČTU
EPÍZOD PLAČU⁹

Čiastočne hydrolyzovaná srvátková bielkovina

- ✓ uľahčuje trávenie¹⁰
- ✓ rýchlosť vyprázdňovania žalúdka porovnateľná s rýchlosťou ako pri kŕmení materským mliekom¹¹

Nízky obsah laktózy

- ✓ obmedzuje plynatosť spôsobenú neúplným trávením laktózy¹²

Prebiotická zmes scGOS/lcFOS (9:1)

- ✓ podporuje rozvoj pozitívnej črevnej mikrobioty^{13,14}
- ✓ zmäkčuje stolicu¹⁵
- ✓ zvyšuje frekvenciu stolice¹⁵

β-PALMITÁT

- ✓ redukuje množstvo vápenatých mydiel a bráni tak vzniku tuhej stolice¹⁶

Škrob pre mierne zahusenie mlieka

- ✓ obmedzuje hltavé pitie a nadmerné prehĺtanie vzduchu¹⁷

Záverečné hodnotenie lekára symptómov u dojčiat v porovnaní so stavom pred začiatkom liečby a po 3 mesiacoch užívania Nutrilon Comfort & Colics:



ZNÍŽENÝ VÝSKYT
DENNÉHO POČTU
KOLÍK U 98% PRÍPADOV



ZNÍŽENÝ
VÝSKYT KOLÍK
V TÝŽDNI O 96 %



ZLEPŠENIE
KONZISTENCIE
STOLICE U 73 % DETÍ




ZLEPŠENIE
CELKOVÉHO
STAVU

VÝSLEDKY SLEDOVANIA


ZNÍŽENIE VÝSKYTU KOLÍK

VÝRAZNÝ EFEKT ZNÍŽENIA
POČTU KOLÍK ZA DEŇ




- ✓ Po 3 mesiacoch **56,3 %** sledovaných detí bolo úplne bez kolík.

ZNÍŽENIE CELKOVÉHO POČTU DNI
KOLÍK V TÝŽDNI




- ✓ Po 3 mesiacoch sa iba u **2,6 %** prípadov vyskytovali koliky trvajúce viac ako 3 dni v týždni.

ZLEPŠENIE KONZISTENCIE STOLICE



- ✓ Už po 1 mesiaci bola zaznamenaná tvrdá stolica iba u **3,8 %** detí a vodnatá len u **1,3 %** detí.

ZLEPŠENIE SPÁNKU




- ✓ Po 3 mesiacoch až u **36,6 %** detí uvádzali rodičia nerušený spánok.

Jedna z najčastejšie vyskytujúcich sa FGIDs u detí je regurgitácia, ktorou trpí 1 z 3 dojčiat^{4,18}

Čo spôsobuje regurgitáciu u detí?

Regurgitácia je spôsobená nezrelým tráviacim traktom dojčťa a zvyčajne ustane počas prvých 12 mesiacov.¹⁹



Otvorený dolný pažerákový zvierač umožňujúci reflux a regurgitáciu.

Regurgitácia môže mať významný vplyv na kvalitu života nielen detí, ale aj ich rodín.^{18,20}

Štúdie ukázali, že formula Nutrilon AR znižuje frekvenciu a závažnosť regurgitácie^{3,21-23*}

ďalšie
výsledky:



Bezpečnosť, tolerancia a rast

- ✓ bezpečná a dobre tolerovaná



GI symptómy

- ✓ významné zlepšenie niekoľkých GI symptómov, ako je plač a nepokoj počas jedného týždňa
- ✓ zníženie frekvencie a trvania plaču
- ✓ zníženie plynatosti a úzkostlivosti u dojčiat
- ✓ priebežné zlepšenie celkovej záťaže GI traktu



Stolica

- ✓ znížený výskyt hnačky a zápch
- ✓ zlepšenie konzistencie stolice



Kvalita života

- ✓ vysoká spokojnosť rodičov s celkovým zdravím dojčťa a kvalitou spánku
- ✓ zlepšenie nepokojného správania dojčiat

